

## Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára

### **Halset 1,5 mg préselt szopogató tablettá** cetilpiridinium-klorid

**Mielőtt elkezdni szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ezt a gyógyszert mindig a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

#### **A betegtájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer a Halset 1,5 mg préselt szopogató tablettá (a továbbiakban Halset tablettá) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Halset tablettá szedése előtt
3. Hogyan kell szedni a Halset tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Halset tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

#### **1. Milyen típusú gyógyszer a Halset tablettá és milyen betegségek esetén alkalmazható?**

A száj- és garatüreg enyhe és középsúlyos fertőzőes megbetegedései esetén, mint torokgyulladás, fogínygyulladás, szájnyálkahártya-gyulladás, rekedtség.

A cetilpiridin baktérium- és gombaölő hatású, nagy felületaktivással rendelkező molekula, ami könnyen bejut a száj- és garatüreg nyálkahártyájába, annak mélyebb rétegeibe is.

A mentol és a borsmentaolaj megszüntetik a száj- és torokgyulladással járó kellemetlen lehetet.

#### **2. Tudnivalók a Halset tablettá szedése előtt**

##### **Ne alkalmazza a Halset tablettát:**

- ha allergiás a cetilpiridinium-kloridra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére,
- gyümölcscukor-túlérzékenység esetén,
- 6 év alatti életkorban.

##### **Figyelmeztetések és óvintézkedések**

A Halset tablettá szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Súlyos garatgyulladás vagy fájdalmas torok esetén, ha az magas lázzal, fejfájással, hányingerrel vagy hányással jár együtt, vagy ha 2 nappal tovább tart, forduljon kezelőorvosához.

##### **Egyéb gyógyszerek és a Halset tablettá**

Gyógyszerkölcsönhatások nem ismertek.

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

**A Halset tablettá egyidejű bevétele étellel és itallal**

A cetilpiridin baktérium elleni hatását az egyidejűleg alkalmazott felületaktív anyagok, pl. fogkrém, csökkentik. Ezért legalább 30 perc teljen el a fogmosás és a Halset alkalmazása között.

**Terhesség, szoptatás és termékenység**

A Halset tablettá alkalmazása elővigyázatosságból kerülendő a terhesség és a szoptatás ideje alatt.

Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer szedése előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

**A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

Nem befolyásolja a vezetési és a gépkezelési képességeket.

**A Halset tablettá szorbitot tartalmaz**

Cukorbetegeknek is adható, mivel édesítőszerként 742,35 mg szorbitot (0,06 szénhidrát egység) tartalmaz tablettánként.

Szorbit-tartalma miatt gyümölcs-cukor túlérzékenységben, valamint a gyümölcs-cukrot bontó (fruktóz 1,6-difoszfátáz) enzim hiányában alkalmazása nem javallt.

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel kezelőorvosát mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert!

**3. Hogyan kell szedni a Halset tablettát?**

A gyógyszert mindig az kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja:

*Felnőtteknek és 12 éven felüli gyermekeknek és serdülőknek:* kb. 1-2 óránként ajánlott 1 tablettát lassan elszopogatni, egy nap alatt maximum 8 tablettát.

*6 és 12 éves kor közötti gyermekeknek:* kb. 2-3 óránként ajánlott 1 tablettát lassan elszopogatni, egy nap alatt maximum 6 tablettát.

*6 éven aluli gyermekeknek:* a tablettá alkalmazása nem javasolt.

Ha a tablettá alkalmazása során hatását túlzottan erősnek érzi, vagy a készítmény csekély hatásának bizonyul, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

**Ha az előírtnál több Halset tablettát vett be**

Túladagolás esetén a száj nyálkahártyán ill. a nyelven égő érzés jelentkezhet. Főként gyermekkorban a szorbit-tartalom miatt hasmenés jelentkezhet.

**Ha elfelejtette bevenni a Halset tablettát**

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott tablettá pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a gyógyszer alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

**4. Lehetséges mellékhatások**

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Nagyon ritkán allergiás reakció léphet fel, mint pl. bőrkiütés. Egyes esetekben átmeneti ízérzékelési zavart okozhat. Előfordulhat a fogak átmeneti barnás elszíneződése, ami rendszeres fogmosással elkerülhető. A szorbit-tartalom miatt előfordulhat hasmenés.

### **Mellékhatások bejelentése**

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül. A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

## **5. Hogyan kell a Halset tablettát tárolni?**

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne alkalmazza ezt a gyógyszert. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

## **6. A csomagolás tartalma és egyéb információk**

### **Mit tartalmaz a Halset tablettá**

- A készítmény hatóanyaga a cetilpiridinium-klorid. 1,5 mg cetilpiridinium-klorid-monohidrát tablettánként.
- Egyéb összetevők: racém mentol, borsmentaolaj, magnézium-sztearát, szorbit.

### **Milyen a Halset tablettá külleme és mit tartalmaz a csomagolás**

*Küllem:* préselt szopogató tablettá – fehér, téglalap alakú, lapos, metszett élű tablettá, jellegzetes borsmenta és mentol illattal és ízzel.

*Csomagolás:* 18 db, ill. 24 db tablettá átlátszó műanyag-alumínium buborékcsoomagolásban és dobozban.

### **A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó**

Gebro Pharma GmbH  
Bahnhofbichl 13  
6391 Fieberbrunn  
Ausztria

*A készítményhez kapcsolódó kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:*

Sager Pharma Kft.  
1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.  
Tel.: 06-1-214-6559

OGYI-T-4106/01      24 db tablettá buborékcsoomagolásban és dobozban

OGYI-T-4106/02      18 db tablettá buborékcsoomagolásban és dobozban

**A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2014. május**