

BETEGTÁJÉKOZTATÓ ÉS CIMKESZÖVEG: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Mycosid külsőleges por (100 g)
Külsőleg!

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.

Ez a gyógyszer orvosi vény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő és szakszerű alkalmazása.

Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.

További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.

Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

Milyen hatóanyagot és segédanyagot tartalmaz a készítmény?

Hatóanyag: 40 mg nátrium paraklórbenzoát 1 g hintőporban.

Segédanyagok: cink-oxid, talkum

Milyen típusú gyógyszer a Mycosid külsőleges por és milyen betegségek esetén alkalmazható?

A hintőpor külsőleges alkalmazású, gombaellenes, enyhe összehúzó és viszketéscsillapító hatású gyógyszer, amely mind száraz, mind nedvedző klinikai elváltozásokat okozó felületi gombás bőrfertőzések megelőzésére és kezelésére javallt.

Mikor nem szabad használni ezt a gyógyszert?

A hatóanyaggal és a segédanyagokkal szembeni ismert túlérzékenység esetén.

Gyermekkorban, valamint terhesség és szoptatás ideje alatt fokozott körültekintéssel alkalmazható.

Alkalmazható-e más gyógyszerekkel egyidejűleg?

A Mycosid külsőleges por más külsőleges készítménnyel egyidejűleg nem alkalmazható.

Hogyan alkalmazza a készítményt?

Az érintett bőrfelület alapos mosása és szárazra törlése után alkalmazható.

Megelőzésre: test hajlatok, illetve a lábfej behintésére, és főleg zárt, rosszul szellőző lábbeli rendszeres viselésekor naponta 1 alkalommal.

Kialakult fertőzések kezelésére: a leggyakrabban érintett területek (láb, lábujjak közei és az ágyéki, hónalji, emlők alatti és egyéb testhajlatok) behintése naponta 1-2 alkalommal.

Lábgombásodás esetén a zoknit és a cipő belsejét is szórja be az újra fertőződés megelőzése érdekében.

Figyelmeztetés:

A Mycosid külsőleges készítmény; szembe és testüregekbe juttatni, lenyelni, továbbá belélegezni tilos.

Kialakulhatnak-e mellékhatások az alkalmazás során?

Ritkán helyi bőrirritáció előfordulhat. Ilyen esetben a hintőport bő, szappanos vízzel le kell mosni.

Hogyan kell tárolni a készítményt?

Szobahőmérsékleten 15-25 °C között tartandó.

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejáratú időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó.

OGYI-T-2901/01

A forgalombahozatali engedély jogosultja:

Meditop Gyógyszeripari Kft.

2097 Pilisborosjenő

Ady Endre u. 1.

Gysz.: Gyi.: Felhasználható:

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2010. június 28.