

## Betegájékoztató: Információk a felhasználó számára

### Neomagnol 1000 mg tabletták klorogén-szeszkvihidráttal

**Mielőtt elkezd alkalmazni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa, vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően alkalmazza.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát, vagy gyógyszerészét.
- Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont.

#### A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Neomagnol 1000 mg tabletták és milyen esetekben alkalmazható?
2. Tudnivalók a Neomagnol 1000 mg tabletták alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Neomagnol 1000 mg tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Neomagnol 1000 mg tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

#### 1. Milyen típusú gyógyszer a Neomagnol 1000 mg tabletták és milyen esetekben alkalmazható?

A Neomagnol 1000 mg tabletták - vízben feloldva higiénés kézfertőtlenítés, fogászati gyökérkezelés, kis felületű sebek, gyümölcs, mosható textíliák, rozsdamentes fémtárgyak, gumi-, műanyag tárgyak, orvosi kézi-eszközök, evőeszközök, konyhaedények, mosható bútorok, berendezési tárgyak, fésűk, kefék, borotválkozási eszközök, gumi-, műanyag gyermekjátékok, WC-, mosdókagylók, kádak, váladékgyűjtő edények és ivóvíz **fertőtlenítésére szolgál.**

#### 2. Tudnivalók a Neomagnol 1000 mg tabletták alkalmazása előtt

##### Ne alkalmazza a Neomagnol 1000 mg tablettát

A Neomagnol 1000 mg tabletták nem alkalmazható a hatóanyagokkal vagy a készítmény bármely összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén.

A tablettát bevenni nem szabad, mert **mérgezést okoz!**

A szert a gyermekek elől gondosan el kell zárni!

##### A Neomagnol 1000 mg tabletták fokozott elővigyázatossággal alkalmazható

Tájékoztassa orvosát, ha Önnél ismert gyógyszer vagy egyéb allergia.

##### Az alkalmazás ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek

Erre vonatkozóan adat nem áll rendelkezésre.

##### Terhesség és szoptatás

A Neomagnol 1000 mg tabletták külsőleg biztonságosan alkalmazható a terhesség és a szoptatás során. Rákkeltő tulajdonságára vonatkozóan humán adat nem áll rendelkezésre.

##### A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A készítmény nem befolyásolja a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

### 3. Hogyan kell alkalmazni a Neomagnol 1000 mg tablettát?

**Higiénis kézfertőtlenítésre:** 1-2 tablettát 1 liter vízben feloldani, a szennyezett kezet először ebben kell 1-3 percig áztatni, majd szappannal kézmosást végezni.

**Evőeszközök, ivóedényzet, konyhaedényzet fertőtlenítésére:** 10 tablettát 1 liter vízben feloldani, a fertőtlenítendő eszközöket 1-2 óráig áztatni, utána tiszta vízben öblíteni.

**Fertőző betegek mosható textíliái (fehérenemű, ágynemű) fertőtlenítésére:** 10 vagy 20 tablettát 1 liter vízben feloldani, ebben az oldatban 2 órán át kell a ruhát áztatni, majd alaposan kiöblíteni. Az oldat a fehéreneműben foltot nem hagy és azt nem rongálja.

**Gumi-, műanyag tárgyak, fésű, kefe, borotválkozási eszközök, gumi-, műanyag gyermekjátékok fertőtlenítésére:** 20 tablettát 1 liter vízben feloldani és a tárgyakat 1-2 óráig áztatni. Fodrászüzletben használatos eszközök tisztántartására és fertőtlenítésére készített oldat naponkénti cseréje szükséges.

**WC-, mosdókagylók, kádak, vialadék gyűjtőedényzet fertőtlenítésére:** 50 tablettát 1 liter vízben oldani. Az oldatot 1-2 órán át nem szabad a tárgyról leöblíteni.

**Ivóvíz fertőtlenítésére:** 10 literenként 2 tablettát kell feloldani a fertőzött vízben, időnként össze kell keverni és legalább 2 óra időtartamig állni hagyni. Ennek eltelte után a víz fogyasztható!

**Gyümölcs fertőtlenítésére:** 2 tablettát 10 liter vízben feloldani, a gyümölcsöt 1/2-1 órán keresztül ebben kell áztatni. Tiszta vizes leöblítés után a gyümölcs fogyasztható!

#### **Mi történik, ha véletlenül lenyeli a tablettát**

A lenyelt tablettából a gyomorsósav hatására klórgáz keletkezik, amely **mérgezést okoz!**

Nagy adag bevétele gégeduzzanatot, tüdővizenyőt és ritkán a keringés összeomlását is eredményezheti.

Lenyelését követően a tápcsatornában általában jelentős maró hatás érvényesül, melyet szűkület kialakulása követhet. Gyakori a hányás a hipoklorit lenyelését vagy kloramin vagy klórgáz belégzését követően. Nagy mennyiség lenyelése esetén vérhányás előfordulhat.

**Nagy mennyiségű tablettá lenyelése vagy belégzése életveszélyes is lehet, ezért azonnal forduljon orvoshoz!**

### 4. Lehetséges mellékhatások

A Neomagnol 1000 mg tablettá alkalmazásakor a kloramin, klór és nátrium-hipoklorit okozhatnak panaszokat. A kloramin az alábbi reakciókat válthatja ki:

- szemirritációt, könnyezést,
- szemhéjduzzanatot,
- tünetmentes szaruhártya-duzzanatot,
- a szaruhártya kimaródását okozhatja.

Mind bőrirritáció, mind allergiás bőrreakció előfordulhat.

Gyökérkezelés során a nátrium-hipoklorit gyökércsúcson túli injektálása az ideg blokkolását eredményezheti.

A kloramin- és a klórgáz belégzése:

- köhögést,
- fuldoklást és légzési nehézséget,
- nagymérvű belégzése vegyi tüdőgyulladást,
- tüdővizenyőt és a légzés összeomlását is eredményezheti.

Ha a gázok jelentős tüdőkárosodást okoznak, a beteg aluszékonnyá válhat, de kóma ritkán fordul elő. Klórgáz belégzése esetén légmell előfordult már. A gázok kismértékű belégzése kezelést nem igényel.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

## **5. Hogyan kell a Neomagnol 1000 mg tablettát tárolni?**

Legfeljebb 25 °C-on, száraz helyen tartandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A dobozon feltüntetett lejárati idő (Felhasználható: ) után ne alkalmazza a Neomagnol 1000 mg tablettát.

## **6. A csomagolás tartalma és egyéb információk**

### **Mit tartalmaz a Neomagnol 1000 mg tablettá?**

- A készítmény hatóanyaga: 1000 mg klorogén-szeszkvihidráttablettánként.
- Egyéb összetevők: vízmentes kolloid szilícium-dioxid, karmellóz-nátrium, burgonyakeményítő.

### **Milyen a Neomagnol 1000 mg tablettá külleme és mit tartalmaz a csomagolás?**

Küllem: fehér vagy csaknem fehér, lapos, kerek, klórszagú, metszett élű tablettá, amely egyik oldalán mélynyomású „+” jelzéssel van ellátva.

Csomagolás: 10 db, illetve 150 db tablettá.

### **A forgalomba hozatali engedély jogosultja**

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.  
Jankovcova 1569/2c,  
17000 Praha 7  
Cseh Köztársaság

### **Gyártó**

Parma Produkt Kft.  
1145 Budapest, Uzsoki u. 36/a.  
Magyarország

OGYI-T- 11705/01 (10 db)  
OGYI-T- 11705/02 (150 db)

**Betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2015. november**