

Betegájékoztató: Információk a felhasználó számára

Strepsils Honey and lemon szopogató tablettá amilmetakrezol, 2,4-diklór-benzil-alkohol

Mielőtt elkezdheti szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. (Lásd 4. pont.)
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 4-6 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Strepsils Honey and lemon szopogató tablettá (továbbiakban Strepsils Honey and lemon tablettá) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Strepsils Honey and lemon tablettá szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Strepsils Honey and lemon tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Strepsils Honey and lemon tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. Milyen típusú gyógyszer a Strepsils Honey and lemon tablettá és milyen betegségek esetén alkalmazható?

Szopogásra szánt méz- és citromízű torokfertőtlenítő gyógyszerkészítmény.

Alkalmazható a torok-, garat-, mandulagyulladás, fogínygyulladás, szájnyálkahártyagyulladás kezelésére, valamint a szájüregben végzett műtétek (mandula, fog, stb.) után a kellemetlen szájszag mérséklésére, ill. a másodlagos fertőzések megakadályozására.

Gyorsan enyhíti a helyi tüneteket, a kínzó torokfájást.

Amilmetakrezol és diklór-benzil-alkohol tartalma fertőtlenítő hatású.

2. Tudnivalók a Strepsils Honey and lemon tablettá szedése előtt

Ne alkalmazza a Strepsils Honey and lemon tablettát:

- ha allergiás (túlérzékeny) az amilmetakrezolra vagy 2,4-diklór-benzil-alkoholra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.
- 4 év alatti életkorban (a félrenyelés fokozott veszélye miatt).

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A megadott dózist nem szabad túllépni.

Ha a gyógyszer alkalmazásakor néhány napon, maximálisan 1 héten belül a tünetek nem enyhülnek, vagy láz, fejfájás, émelygés, hányás is jelentkezik, egyéb kezelésre van szükség és orvoshoz kell fordulni.

Egyéb gyógyszerek és a Strepsils Honey and lemon tablettá

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Klinikailag jelentős gyógyszerkölsönhatás nem ismert.

Terhesség, szoptatás és termékenység

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Emberekre vonatkozó gyógyszerbiztonsági vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre, ezért a készítmény alkalmazása nem ajánlott orvosi felügyelet nélkül.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre

A Strepsils Honey and lemon tabletták nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolják a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

A Strepsils Honey and lemon tabletták glükózt és szacharózt tartalmaz

A készítmény szénhidrát tartalma kb. 2,5 g/tabletta (glükóz és szacharóz) és 0,13 g méz/tabletta, ezért cukorbetegség esetében alkalmazása nem javasolt.

Ha kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel kezelőorvosát, mielőtt elkezd alkalmazni ezt a gyógyszert.

3. Hogyan kell alkalmazni a Strepsils Honey and lemon tablettát?

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja:

A tünetek kezeléséhez a legalacsonyabb hatásos dózist kell alkalmazni a lehető legrövidebb ideig. A gyulladási tünetei általában néhány (4-6) napon belül megszűnnek.

Felnőttek:

1 szopogató tabletták naponta 5 alkalommal, 2-3 órás időközönként.

Gyermekek:

5 éves kor feletti gyermekeknek naponta 3-4 tabletták.

4-5 éves korú gyermekeknek naponta 3 tabletták.

4 éves kor alatti gyermekeknek nem adható a félrenyelés fokozott veszélye miatt.

Idősek:

Időskorban nem szükséges a javasolt adagot csökkenteni.

Az alkalmazás módja

Szájnyálkahártyán történő alkalmazásra. A tablettát lassan kell elszipogatni, közvetlenül étkezés után. A táplálkozást, ivást és fogmosást ezután 1-2 órán át kerülni kell.

Ha az előírtnál több Strepsils Honey and lemon tablettát vett be

A Strepsils Honey and lemon tabletták természete és kiegészítése miatt véletlen vagy szándékos túladagolás nagyon valószínűtlen.

Esetleges túladagolása a gyomor-bélrendszer diszkomfortérzését okozhatja.

Ha az előírtnál több Strepsils Honey and lemon tablettát vett be, azonnal forduljon kezelőorvosához.

Ha elfelejtette bevenni a Strepsils Honey and lemon tablettát

Ha elfelejtette alkalmazni a tablettát, amint eszébe jut, pótolja azt, kivéve, ha már közeledik a következő adag bevitelének ideje. Ne alkalmazzon kétszeres adagot a kihagyott tabletták pótlására, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének teszi ki magát.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Minden gyógyszerrel szemben kialakulhat túlérzékenységi reakció. Ezért felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben szokatlan tüneteket (pl. duzzanat a test bármely részén, bőrkiütés, hirtelen vérnyomásesés, stb.) észlel, a gyógyszer alkalmazását azonnal hagyja abba és feltétlenül forduljon kezelőorvosához.

A Strepsils Honey and lemon tabletták alkalmazása esetén fellépő mellékhatások az alábbi gyakoriság szerint alakulhatnak ki:

Nagyon ritka (10 000-ből legfeljebb 1 beteget érinthet):

- allergiás reakció (bőrirritáció, bőrpír, duzzadás)
- kiütés, kontakt bőrgyulladás, a bőr alatti szövetek duzzanata, bőrpír
- emésztési zavar (gyomorégés a kezelés első napján)

Nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg):

- hasi fájdalom, émelygés, szájnyálkahártya-irritáció, a kezelés első két napján a nyelv égő, szúró érzése

Mellékhatások bejelentése

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található [elérhetőségeken keresztül](#).

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. Hogyan kell a Strepsils Honey and lemon tablettát tárolni?

Buboréksomagolásban: Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

Tartályban: Legfeljebb 25°C-on tárolandó. Felbontás után három hónapig használható fel.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne szedje a Strepsils Honey and lemon tablettát. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

Mit tartalmaz a Strepsils Honey and lemon tabletták?

- A készítmény hatóanyagai: Minden szopogató tabletták 0,6 mg amilmetakrezolt és 1,2 mg 2,4-diklór-benzil_alkoholt tartalmaz.
- Egyéb összetevők: kinolinsárga (E104), borsosmentaolaj, citromolaj, méz, borkősav, glükóz, szacharóz.

Milyen a Strepsils Honey and lemon tabletták külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Sárga színű, korong alakú, lapos felületű, jellegzetes méz- és citromízű szopogató tabletták, mindkét oldalán „S” jelzéssel ellátva.

Csomagolás:

12 db és 24 db és 36 db tabletta átlátszó PVC/PVDC//Al buboréksomagolásban, dobozban ill. fémdobozban.

10 db szopogató tabletta fehér garanciazáras műanyag (PE) kupakkal lezárt fehér műanyag (PP) tartályban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.

103-105 Bath Road, Slough

Berkshire SL1 3UH

Egyesült Királyság

Gyártó:

Reckitt Benckiser Healthcare International

Limited,

Nottingham Site

Thane Road Nottingham

NG90 2DB

Egyesült Királyság

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:

Reckitt Benckiser Kft.

1113 Budapest, Bocskai út 134-146.

Tel: 06 1 880-1870

Fax: 06 1 250-8398

E-mail: gyogyszer@reckittbenckiser.com

OGYI-T-4519/05	12×	buboréksomagolásban, dobozban
OGYI-T-4519/06	12×	buboréksomagolásban, fémdobozban
OGYI-T-4519/07	24×	buboréksomagolásban, dobozban
OGYI-T-4519/08	36×	buboréksomagolásban, dobozban
OGYI-T-4519/09	10×	tartályban.

Betegájékoztató engedélyezésének dátuma: 2016. március