

## Betegájékoztató: Információk a felhasználó számára

### Strepsils menthol and eucalyptus szopogató tablettá amilmetakrezol, 2,4-diklór-benzil-alkohol, levomentol

**Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegájékoztatót, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz.**

Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. (Lásd 4. pont.)
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 4-6 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

#### **A betegájékoztató tartalma:**

1. Milyen típusú gyógyszer a Strepsils menthol and eucalyptus szopogató tablettá (továbbiakban Strepsils menthol and eucalyptus tablettá) és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Strepsils menthol and eucalyptus tablettá szedése előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Strepsils menthol and eucalyptus tablettát?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Strepsils menthol and eucalyptus tablettát tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

#### **1. Milyen típusú gyógyszer a Strepsils menthol and eucalyptus tablettá és milyen betegségek esetén alkalmazható?**

Szopogatóra szánt mentol- és eukaliptuszízű torokfertőtlenítő gyógyszerkészítmény.

Alkalmazható a torok-, garat-, mandulagyulladás, fogínygyulladás, szájnyálkahártya-gyulladás kezelésére, valamint a szájüregben végzett műtétek (mandula, fog, stb.) után a kellemetlen szájszag mérséklésére, ill. a másodlagos fertőzések megakadályozására, valamint megfázással járó száraz, irritáló köhögés és orrdugulás kezelésére.

Gyorsan enyhíti a helyi tüneteket, a kínzó torokfájást.

Amilmetakrezol- és diklór-benzil-alkohol-tartalma fertőtlenítő hatású.

#### **2. Tudnivalók a Strepsils menthol and eucalyptus tablettá szedése előtt**

##### **Ne alkalmazza a Strepsils menthol and eucalyptus tablettát:**

- ha allergiás (túlérzékeny) az amilmetakrezolra, a 2,4-diklór-benzil-alkoholra vagy a levomentolra, illetve a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.
- 4 év alatti életkorban (a félrenyelés fokozott veszélye miatt).

##### **Figyelmeztetések és óvintézkedések**

A megadott dózist nem szabad túllépni.

Ha a gyógyszer alkalmazásakor néhány napon, maximálisan 1 héten belül a tünetek nem enyhülnek, vagy láz, fejfájás, émelygés, hányás is jelentkezik, egyéb kezelésre van szükség és orvoshoz kell fordulni.

##### **Egyéb gyógyszerek és a Strepsils menthol and eucalyptus tablettá**

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett, valamint szedni tervezett egyéb gyógyszereiről.

Klinikailag jelentős gyógyszerkölcsonhatás nem ismeretes.

### **Terhesség, szoptatás és termékenység**

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. Ha Ön terhes vagy szoptat, illetve ha fennáll Önnél a terhesség lehetősége vagy gyermeket szeretne, a gyógyszer alkalmazása előtt beszéljen kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

Emberekre vonatkozó gyógyszerbiztonsági vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre, ezért a készítmény alkalmazása nem ajánlott orvosi felügyelet nélkül.

### **A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességekre**

A Strepsils menthol and eucalyptus tableta nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolja a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

### **A Strepsils menthol and eucalyptus tableta glükózt és szachatózt tartalmaz**

A készítmény szénhidrátot tartalmaz kb. 2,5 g/tableta (glükóz és szacharóz), ezért cukorbetegnek alkalmazása nem javasolt.

Ha kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel kezelőorvosát, mielőtt elkezd alkalmazni ezt a gyógyszert.

## **3. Hogyan kell alkalmazni a Strepsils menthol and eucalyptus tablettát?**

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje. Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

A készítmény ajánlott adagja:

A tünetek kezeléséhez a legalacsonyabb hatásos dózist kell alkalmazni a lehető legrövidebb ideig. A gyulladási tünetei általában néhány (4-6) napon belül megszűnnek.

#### Felnőttek:

1 szopogató tableta naponta 5 alkalommal, 2-3 órás időközönként.

#### Gyermekek:

5 éves kor feletti gyermekeknek naponta 3-4 tableta.

4-5 éves korú gyermekeknek naponta 3 tableta.

4 éves kor alatti gyermekeknek nem adható a félrenyelés fokozott veszélye miatt.

#### Idősek:

Időskorban nem szükséges a javasolt adagot csökkenteni.

#### Az alkalmazás módja

Szájnyálkahártyán történő alkalmazásra. A tablettát lassan kell elszopogatni, közvetlenül étkezés után. A táplálkozást, ivást és fogmosást ezután 1-2 órán át kerülni kell.

### **Ha az előírtnál több Strepsils menthol and eucalyptus tablettát vett be**

A Strepsils menthol and eucalyptus tableta természete és kizsérrelése miatt véletlen vagy szándékos túladagolás nagyon valószínűtlen.

Esetleges túladagolása a gyomor-bélrendszer diszkomfortérzését okozhatja.

Ha az előírtnál több Strepsils menthol and eucalyptus tablettát vett be, azonnal forduljon kezelőorvosához.

### **Ha elfelejtette bevenni Strepsils menthol and eucalyptus tablettát**

Ha elfelejtette alkalmazni a tablettát, amint eszébe jut pótolja azt, kivéve, ha már közeledik a következő adag bevitelének ideje. Ne alkalmazzon kétszeres adagot a kihagyott tableta pótlására, mert ezzel már nem pótolja a kiesett mennyiséget, viszont a túladagolás veszélyének teszi ki magát.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

#### 4. Lehetséges mellékhatások

Mint minden gyógyszer, így ez a gyógyszer is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Minden gyógyszerrel szemben kialakulhat túlérzékenységi reakció. Ezért felhívjuk a figyelmét, amennyiben szokatlan tüneteket (pl. duzzanat a test bármely részén, bőrkiütés, hirtelen vérnyomásesés stb.) észlel, a gyógyszer alkalmazását azonnal hagyja abba és feltétlenül forduljon kezelőorvosához.

A Strepsils menthol and eucalyptus tableta alkalmazása esetén fellépő mellékhatások az alábbi gyakoriság szerint alakulhatnak ki:

*Nagyon ritka (10 000-ből legfeljebb 1 beteget érinthet):*

- allergiás reakció (bőrirritáció, bőrpír, duzzadás)
- kiütés, kontakt bőrgyulladás, a bőr alatti szövetek duzzanata, bőrpír
- emésztési zavar (gyomorégés a kezelés első két napján)

*Nem ismert (a rendelkezésre álló adatokból nem állapítható meg):*

- hasi fájdalom, émelygés, szájnyalkahártya-irritáció, a kezelés első két napján a nyelv égő, szúró érzése

#### Mellékhatások bejelentése

Ha Önénél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségeken keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

#### 5. Hogyan kell a Strepsils menthol and eucalyptus tablettát tárolni?

Legfeljebb 25°C-on tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A csomagoláson feltüntetett lejárati idő (Felhasználható:) után ne szedje a Strepsils menthol and eucalyptus tablettát. A lejárati idő az adott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy a háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a már nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

#### 6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

##### Mit tartalmaz a Strepsils menthol and eucalyptus tableta?

- A készítmény hatóanyagai: Minden szopogató tableta 0,6 mg amilmetakrezolt, 1,2 mg 2,4-diklór-benzil-alkoholt és 8, mg levomentolt tartalmaz.
- Egyéb összetevők: indigókármin (E132), eukaliptusz olaj, borkősav, glükóz, szacharóz.

##### Milyen a Strepsils menthol and eucalyptus tableta külleme és mit tartalmaz a csomagolás?

Kék színű, korong alakú, lapos felületű, jellegzetes ízű szopogató tableta, mindkét oldalán „S” jelzéssel ellátva.

Csomagolás: 12 db, 24 db, ill. 36 db tablettá átlátszó PVC/PVDC//Al buboréksomagolásban és dobozban.

**A forgalomba hozatali engedély jogosultja**

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.  
103-105 Bath Road, Slough  
Berkshire SL1 3UH  
Egyesült Királyság

**Gyártó:**

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd.  
Nottingham Site  
Thane Road, Nottingham NG90 2DB  
Egyesült Királyság

*A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviselőjéhez:*

Reckitt Benckiser Kft.  
1113 Budapest, Bocskai út 134-146.  
Tel: 06 1 880-1870  
Fax: 06 1 250-8398  
E-mail: [gyogyszer@reckittbenckiser.com](mailto:gyogyszer@reckittbenckiser.com)

OGYI-T-4521/01 (24 db)

OGYI-T-4521/02 (12 db)

OGYI-T-4521/03 (36 db)

**A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2016. március**