

BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA

Tetran külsőleges por oxitetraciklin-hidroklorid

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót. E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múltó panaszokat kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer körültekintő, szakszerű alkalmazása.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnának.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer a Tetran külsőleges por és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Tetran külsőleges por alkalmazása előtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Tetran külsőleges port?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Tetran külsőleges port tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A TETTRAN KÜLSŐLEGES POR ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Széles spektrumú, antibiotikum tartalmú külsőleges por, oxitetraciklinre érzékeny kórokozók által okozott felületes sebfertőzések kezelésére.

A külsőleges por hatóanyaga túlérzékenységi reakciót okozhat, bár helyi alkalmazás mellett ez nem valószínű.

2. TUDNIVALÓK A TETTRAN KÜLSŐLEGES POR ALKALMAZÁSA ELŐTT

Ne alkalmazza a külsőleges port:

- ha a készítmény hatóanyagával vagy más tetraciklin származékkal illetve a készítmény bármely más összetevőjével szemben túlérzékenység, allergiás reakció, csalánkiütés korábban előfordult.
- ha a hintőpor fájdalmas irritációt, gyulladást vált ki. Ha ilyen tünetet észlel, azonnal kérjen orvosi segítséget.
- mély sebeket a por elzárhatja a levegő oxigénjétől, így bizonyos kórokozók elszaporodhatnak.

A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek

Jelenleg, illetve a közelmúltban szedett receptköteles vagy vény nélkül kiváltható gyógyszereiről tájékoztassa orvosát vagy gyógyszerészét.

Terhesség és szoptatás

Ha Ön terhes vagy gyermekét szoptatja, az oxitetraciklin külsőleges por formában történő, helyi alkalmazása nem jelent veszélyt Ön és gyermeke egészségére.

Minden esetben szigorúan tartsa be kezelőorvosa utasításait!

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A TETTRAN KÜLSŐLEGES PORT?

Az alkalmazás módja

Általában naponta 1-2-szer a fertőzött terület megtisztítása, a pörkös felrakódások eltávolítása után az egész sebfelületet vékony rétegben behinteni.

Ha nem tudja, hogyan használja a készítményt, minden esetben kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét!

A kezelés időtartama

A Tetran külsőleges por alkalmazási gyakoriságát és a kezelés idejét kezelőorvosa szabja meg, a fertőzés típusától és súlyosságától függően.

Addig, és csak addig használja a szert, amíg orvosa tanácsolja. Korán abbahagyott antibiotikus kúra a tünetek visszatérését eredményezheti. Ha elfelejti gyógyszerét használni, ahogy eszébe jut, folytassa az előírt módon.

Soha ne alkalmazza a készítményt naponta többször, mint az előírt adag!

Mikor forduljon orvoshoz?

Minden esetben, ha korábban ismeretlen tünetet észlel a készítmény alkalmazása során / lásd „Lehetséges mellékhatások” leírásban /

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, így a Tetran külsőleges pornak is lehetnek mellékhatásai

Ha az alábbi tünetek bármelyikét észleli, a Tetran külsőleges por alkalmazását hagyja abba, azonnal értesítse orvosát vagy jelentkezzen a legközelebbi kórház ügyeletén.

Néhányan allergiásak lehetnek az oxitetraciklinre. A külsőleges por használatát követő tünetek a következők lehetnek: kiütés, csalánkiütés, viszketés, a bőrön megjelenő apró piros pöttyök, kidagadó felszínes bőr alatti erek, esetleg fekélyes, sebes bőrfelületek.

E tüneteket kísérheti hányinger, fejfájás.

Ezek nagyon súlyos mellékhatások. Ha a fenti tünetek bármelyikét tapasztalja, Önnek súlyos allergiás reakciója lehet a készítménnyel szemben és sürgős orvosi segítségre, esetleg kórházi ellátásra lehet szüksége.

E rendkívül súlyos mellékhatások rendkívül ritkák.

Mielőbb értesítse orvosát, ha a következő tünetek bármelyikét észleli.

A külsőleges por használata idején fájdalmas, gyulladásszerű tünetek léphetnek fel az alkalmazás helyén. Ennek oka allergia, irritáció vagy az antibiotikumok használatakor előforduló ellenálló baktériumok, vagy gombák túlnövekedése lehet. Ha bármi kérdése van ezzel kapcsolatban, forduljon orvosához.

Ezek mind enyhe mellékhatások, melyek előfordulása ritka.

Ha bármilyen, a fentiekben nem említett mellékhatást észlel, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A TETRAN KÜLSŐLEGES PORT TÁROLNI?

Legfeljebb 25 °C-on, a fénytől és nedvességtől való védelem érdekében az eredeti csomagolásban tárolandó.

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

Ne alkalmazza a készítményt, ha színében, szagában változást észlel.

Ne feledje! Ez az Ön gyógyszere. Senki másnak NE adjon belőle, még akkor sem, ha hasonló tünetei vannak!

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Tetran külsőleges por

- Hatóanyag: 0,05 g oxitetraciklin 1 g porban.
- Segédanyagok: Metil-parahidroxibenzoát, laktóz-monohidrát.

Milyen a készítmény külleme

Hintőpor: csaknem fehér vagy világosbarna, finom, homogén por.

A forgalombahozatali engedély jogosultja és a gyártó

WAGNER-PHARMA KFT.

Kossuth L. u. 44.

H-3242 Parádsasvár

OGYI-T- 3103/01 (10 g)

OGYI-T- 3103/02 (50 g)

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2011. január 31.