

Lomexin 2 % krém

(Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
Via Civitali I.
20148 Milan
Olaszország)

Összetétel

Hatóanyag: 20 mg Fenticonazolium nitricum 1 g krémbe.

Segédanyagok: nátrium-edetát, hidrogénezett gyapjúviasz, cetil-alkohol, glicerin-monosztearát, propilén-glikol, mandulaolaj, zsírsavak makrogol-észterei (Xalifin 15), tisztított víz.

Gombaellenes készítmény helyi használatra.

Javallatok

A krém a bőr gombás megbetegedéseinek tüneti kezelésére szolgál, hatékony a leggyakrabban előforduló bőrelváltozást okozó gombák esetében. Használható a test bármelyik pontján: fej-bőrön, kézen, karon, lábon, arcon, a lábujjak között, szakállban, illetve a körmön jelentkező gombásodás kezelésére, még abban az esetben is, ha ez kis mértékben baktériummal fertőződött. Így hatékony pelenka okozta kipállásban, begyulladt körömágy, herezacskón, illetve a gát-tájékon jelentkező gombás fertőzés kezelésére is. Amennyiben dobhártyasérülés kizárható, fülben (a külső hallójáratban) is használható.

Ellenjavallatok

Túlérzékenység a termék összetevőire.

Jóllehet a fenticonazole bőrön keresztül felszívódása igen alacsony, mégis javasoljuk, hogy kerülje a készítmény alkalmazását terhesség és szoptatás alatt.

Használati óvintézkedések

A termék helyi, főleg tartós alkalmazása érzékenységet okozhat.

Ilyenkor függesse fel a kezelést, és beszélje meg kezelőorvosával a megfelelő terápiát.

A Lomexin bőrre használatos krém alkalmazása után kerülje a közvetlen napsugárzást és az UV sugarakat.

Kölcsönhatások

Nem ismertek.

Figyelmeztetések

Ha rövid kezelési időszak eltelte után nem észlel javulást, akkor kérje kezelőorvosa tanácsát.

Adagolás, alkalmazás módja és ideje

A krémet, az orvosi utasításnak megfelelően, de általában napi 1-2-szer kell alkalmazni. A gondosan megmosott és megszáritott fertőzött bőrt a krémmel be kell kenni, és finoman bedörzsölni. Körömgombásodás esetén a bekrémezett körmöt ajánlott bekötni. A Lomexin krém nem zsíros, nem hagy foltot és vízzel könnyen eltávolítható.

Minden esetben kövesse szigorúan orvosa előírását!

Mellékhatások

Mint minden gyógyszernek, a Lomexin-nek is lehetnek mellékhatásai.

A Lomexint a bőr és a nyálkahártya általában jól tűri. Enyhe, átmeneti bőrpírt csak kivételes esetekben jelentettek.

A sérülésekre való alkalmazáskor enyhe égető érzés jelentkezhet, ami általában gyorsan elmúlik.

Előírás szerinti használat esetén a Lomexin kis mértékben szívódik fel, így a szervezeti kihatások kizárhatók.

Ha a fenti felsorolásban nem szereplő egyéb mellékhatást észlel, erről értesítse orvosát vagy gyógyszerészét!

A gyógyszert a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni.

A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni.

OGYI-T- 7873/01

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2008. október 31.