



GYEMSZI

Gyógyszerészeti és Egészségügyi
Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet

Országos
Gyógyszerészeti
Intézet



1051 Budapest, Zrínyi utca 3.
Levél cím: 1372, Postafiók 450.
Tel.: 06-1/886-9300
Fax: 06-1/ 886-9460
E-mail: ogyi@ogyi.hu, Web: www.ogyi.hu

Oscillococcinum golyócskák egyadagos tartályban betegtájékoztatója

OGYI/39723-4/2013 sz. határozat 2/2. sz. melléklete

Betegtájékoztató: információk a felhasználó számára

Oscillococcinum golyócskák egyadagos tartályban

(Oscillococcinum golyócskák)

Homeopátiás gyógyszer

Mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön számára fontos információkat tartalmaz.

Ezt a gyógyszert mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is szüksége lehet.
- További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
- Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt bármely lehetséges mellékhatásra is vonatkozik. Lásd 4. pont
- Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei 3 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.

A betegtájékoztató tartalma:

1. Milyen típusú gyógyszer az Oscillococcinum golyócskák és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók az Oscillococcinum golyócskák szedése előtt
3. Hogyan kell szedni az Oscillococcinum golyócskákat ?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell az Oscillococcinum golyócskákat tárolni?
6. A csomagolás tartalma és egyéb információk

1. MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER AZ OSCILLOCOCCINUM GOLYÓCSKÁK ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

Az Oscillococcinum golyócskák homeopátiás gyógyszer, mely a homeopátiás gyakorlatban az influenzás tünetek (hidegrázás, általános fájdalom, láz, orrfolyás, köhögés) enyhítésére alkalmazható. Állati eredetű anyagok felhasználásával készült golyócskák.

2. TUDNIVALÓK AZ OSCILLOCOCCINUM GOLYÓCSKÁK SZEDÉSE ELŐTT

Ne szedje az Oscillococcinum golyócskákat

- ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagokra vagy a gyógyszer (6. pontban felsorolt) egyéb összetevőjére.

Figyelmeztetések és óvintézkedések

A homeopátiás kezelés kezdetén a betegség tünetei átmenetileg felerősödnek. Ezek átmenetiek és veszélytelenek.

Amennyiben kezelőorvosa korábban már figyelmeztette Önt, hogy bizonyos cukrokra érzékeny, keresse fel orvosát, mielőtt elkezdi szedni ezt a gyógyszert.

Tejcukor (laktóz) érzékenyek vegyék figyelembe, hogy a készítmény egy adagja 0,15 g tejcukrot tartalmaz!

Cukorbetegség esetén figyelembe kell venni, hogy a készítmény egy adagja 0,85 g szacharózt tartalmaz.

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) terméket (pl. cukorka, stb.) fogyasztani, és intenzív illatú fogkrémet használni. A kezelés ideje alatt aromás anyagokat tartalmazó kenőcsöt (pl. kámforos) sem szabad alkalmazni, mivel ezek jelentős mértékben képesek befolyásolni a homeopátiás gyógyszer hatását.

Nem a javallat szerinti, ill. a gyógyszer hosszantartó szedése esetén, vagy a betegtájékoztatóban feltüntetett adagok túllépése esetén nem kívánt hatások (*ún. gyógyszervizsgálati tünetek*) léphetnek fel, amelyek új, eddig nem tapasztalt panaszok formájában jelentkezhetnek.

Amennyiben a tünetek nem javulnának, esetleg rosszabbodnának, vagy új tünetek jelennek meg, orvossal történő konzultáció szükséges.

Egyéb gyógyszerek és az Oscilloccinum golyócskák

Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszereiről, beleértve a vény nélkül kapható készítményeket is.

Az Oscilloccinum golyócskák egyidejű bevétele étellel és itallal

A homeopátiás gyógyszerek alkalmazásának időtartama alatt nem szabad illóolajat is tartalmazó (mentolos, eukaliptuszos) terméket (pl. étel, ital, stb.) fogyasztani.

Terhesség, szoptatás és termékenység

Mielőtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelőorvosával vagy gyógyszerészével. A készítmény hatóanyagainak a termékenységet befolyásoló hatására vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre.

Terhesség és szoptatás időszaka alatt biztonságosan szedhető.

A készítmény hatásai a gépjárművezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre

Az Oscilloccinum golyócskák nem befolyásolják a gépjárművezetéshez és a gépek kezeléséhez szükséges képességeket.

3. HOGYAN KELL SZEDNI AZ OSCILLOCCINUM GOLYÓCSKÁKAT?

Az Oscilloccinum golyócskákat mindig pontosan a betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által elmondottaknak megfelelően szedje.

Amennyiben nem biztos az adagolást illetően, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

A legkedvezőbb hatás elérésének érdekében a homeopátiás gyógyszerkészítmény alkalmazását az influenza kezdeti tüneteinek jelentkezésekor meg kell kezdeni.

A készítmény ajánlott adagja:

- Influenzás időszakban: hetente egyszer 1 adag, azaz egy műanyag tartály tartalma.
- Az influenzás tünetek jelentkezésekor: 1 adagot bevenni, majd ezt 2-szer, esetleg 3-szor (6 óránként) megismételni.
- A már kialakult influenza esetén: naponta 2-szer (reggel és este) 1 adag 1-3 napon át.

Az adagot étkezés előtt negyedórával vagy étkezés után 1 órával a nyelv alá helyezve kell bevenni. A nyelv alá helyezett golyócskák a bevételel követően hamarosan feloldódnak.

A készítményt gyermekek és csecsemők is szedhetik

Csecsemőknek a félrenyelés veszélye miatt – kevés, előzőleg kiforralt, majd lehűtött – vízben feloldva kell adagolni.

Amennyiben a tünetek 3 napon túl is változatlanul fennállnak, javulás nem következik be, forduljon kezelőorvoshoz vagy gyógyszerészhez.

Ha az előírtnál több Oscillococcinum golyócskát vett be

Kérjen tanácsot orvosától vagy gyógyszerészétől.

Ha elfelejtette bevenni az Oscillococcinum golyócskákat

Ha elfelejtette bevenni az előírt adagot, pótolja azt mielőbb. Ha az elfelejtett adag pótlása és a következő előírás szerinti adag bevétele nagyjából azonos időpontra esik, folytassa a gyógyszer szedését az eredetileg előírt módon.

Ne vegyen be kétszeres adagot a kihagyott adag pótlására.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kapcsolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógyszerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszer, így az Oscillococcinum golyócskák is okozhat mellékhatásokat, amelyek azonban nem mindenkinél jelentkeznek.

Az Oscillococcinum golyócskák alkalmazásával kapcsolatban eddig mellékhatást nem jelentettek.

Mellékhatások bejelentése

Ha Önél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy gyógyszerészét. Ez a beteg tájékoztatóban fel nem sorolt bármilyen lehetséges mellékhatásra is vonatkozik.

A mellékhatásokat közvetlenül a hatóság részére is bejelentheti az [V. függelékben](#) található elérhetőségen keresztül.

A mellékhatások bejelentésével Ön is hozzájárulhat ahhoz, hogy minél több információ álljon rendelkezésre a gyógyszer biztonságos alkalmazásával kapcsolatban.

5. HOGYAN KELL AZ OSCILLOCOCCINUM GOLYÓCSKÁKAT TÁROLNI?

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó!

Legfeljebb 25°C-on, fénytől, közvetlen napsugárzástól és erős elektromágneses hatásoktól védve, az eredeti csomagolásban tárolandó.

A dobozon és a tartályon feltüntetett lejárati idő után ne szedje az Oscillococcinum golyócskákat. A lejárati idő a megadott hónap utolsó napjára vonatkozik.

Ne szedje az Oscillococcinum golyócskákat, ha azokon a bomlás jelei láthatók.

Semmilyen gyógyszert ne dobjon a szennyvízbe vagy háztartási hulladékba. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy mit tegyen a fel nem használt gyógyszereivel. Ezek az intézkedések elősegítik a környezet védelmét.

6. A CSOMAGOLÁS TARTALMA ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz az Oscillococcinum golyócskák egyadagos tartályban

- Készítmény hatóanyagai: 0,01 ml Anas barbariae hepatitis et cordis kivonat (extractum) 200 K/1 g
- Egyéb összetevők: szacharóz (0,85g), laktóz-monohidrát (0,15 g).

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás

Fehér színű, kisméretű, homogén, szagtalan, édes ízű golyócskák pattintós LDPE kupakkal lezárt, fehér színű PP tartályba töltve.

1 x 3 adag, 2 x 3 adag, 10 x 3 adag (tartály) átlátszó PVC/papír buborékfóliában és dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártók

A forgalomba hozatali engedély jogosultja:

BOIRON

2 avenue de l' Ouest Lyonnais

69510 Messimy, France

Gyártó:

BOIRON

20 rue de la Libération

69110 Sainte-Foy-lès-Lyon, France

BOIRON

2 avenue de l' Ouest Lyonnais

69510 Messimy, France

Nyilvántartás számai:

OGYI-HG-026/02 3 adag

OGYI-HG-026/03 6 adag

OGYI-HG-026/04 30 adag

A betegtájékoztató legutóbbi felülvizsgálatának dátuma: 2013. december